

主要産地における令和2年産水稻の生育状況等について 第15報 (8月20日取り纏め)

作成：公益社団法人米穀安定供給確保支援機構情報部 (令和2年8月20日)

道府県	区分	生育状況等		(参考)
		育苗・田植進行状況・生育状況等(自治体等公表資料の抜粋)	技術・防除・気象等関連公表資料(自治体、気象台等公表資料の抜粋)	
北海道	(生育)	<p>【生育状況(8月15日現在)】</p> <p>(全道) 生育は、平年並に推移している。(北海道農政部 8月19日付)</p> <p>(空知) 生育は平年並である。(空知総合振興局 8月19日付)</p> <p>(石狩) 生育は平年並である。(石狩振興局 8月19日付)</p> <p>(後志) 遅速は早1日。(後志総合振興局 8月19日付)</p> <p>(胆振) 生育は平年並。(胆振総合振興局 8月19日付)</p> <p>(日高) 生育は平年並である。(日高総合振興局 8月19日付)</p> <p>(渡島) 生育は概ね順調。茎数の多い一部ほ場では穂揃いに時間がかかった。(渡島総合振興局 8月19日付)</p> <p>(檜山) 生育は概ね平年並で推移。(檜山振興局 8月19日付)</p> <p>(上川) 生育は、平年並か平年よりもやや早く推移している。(上川総合振興局 8月19日付)</p> <p>(留萌) 生育は、平年並に進んでいる。(留萌振興局 8月19日付)</p> <p>(オホーツク) 生育は平年並である。(オホーツク総合振興局 8月19日付)</p>	<p>【向こう1か月の天候の見通し 8月22日～9月21日】</p> <p>北海道地方の向こう1か月の平均気温は高い見込み。降水量と日照時間は、ほぼ平年並の見込み。(気象庁札幌管区気象台)</p> <p>【高温に関する早期天候情報】</p> <p>北海道地方は、8月25日頃からかなりの高温。(気象庁仙台管区気象台)</p> <p>【向こう3か月の天候の見通し 8月～10月】</p> <p>北海道地方の向こう3か月の平均気温は平年並か高い見込み。降水量は、ほぼ平年並の見込み。(気象庁札幌管区気象台)</p>	<p>主要品種に大きな変動はないものの、産種割合に達した新品種「えみまる」が増加すると見込まれる。</p> <p>(農林水産省 3月17日)</p> <p>(以下同じ)</p>
		<p>・8月10日現在の水稻出穂状況は、県全体で98%となっており、平年より5ポイント上回った。</p> <p>・県全体の出穂終わりは、平年より1日早い8月10日であった。(青森県 8月12日付)</p> <p>(作況調査報告) ( (地独) 青森県産業技術センター農林総合研究所 8月6日付)</p> <p>(黒石) 「つがるロマン」の出穂期は8月2日で平年より1日早かった。</p> <p>「青天の霹靂」の出穂期は8月3日で平年並だった。</p> <p>「まっしぐら」の出穂期は8月1日で平年並だった。</p> <p>(十和田) 「まっしぐら」の出穂期は8月4日だった。</p>	<p>【向こう1か月の天候の見通し 8月22日～9月21日】</p> <p>東北地方の向こう1か月の気温は高い見込み。降水量と日照時間は、ほぼ平年並の見込み。(気象庁仙台管区気象台)</p> <p>【高温に関する早期天候情報】</p> <p>東北地方は、8月24日頃からかなりの高温。(気象庁仙台管区気象台)</p> <p>【向こう3か月の天候の見通し 8月～10月】</p> <p>東北地方の向こう3か月の平均気温は平年並か高い見込み。降水量は、ほぼ平年並の見込み。(気象庁仙台管区気象台)</p>	<p>「つがるロマン」「まっしぐら」の2品種で9割を占める品種構成で、近年収量水準の高い「まっしぐら」が増加傾向にあり、令和2年産も同様の傾向になるものと考えられる。</p>
岩手	(生育)	<p>【8月15日現在】</p> <p>(1) 農業研究センター(北上)</p> <p>「ひとめぼれ」では8月8日(平年より3日遅い)、「あきたこまち」では8月4日(平年より4日遅い)、「銀河のしずく」では8月6日(平年より4日遅い)に出穂期に達した。</p> <p>(2) 県北農業研究所(軽米)</p> <p>「いわてっこ」では、8月6日(平年より2日遅い)に出穂期に達した。</p> <p>(岩手県農業研究センター 8月17日付)</p>	<p>【向こう1か月の天候の見通し 8月22日～9月21日】</p> <p>東北地方の向こう1か月の気温は高い見込み。降水量と日照時間は、ほぼ平年並の見込み。(気象庁仙台管区気象台)</p> <p>【高温に関する早期天候情報】</p> <p>東北地方は、8月24日頃からかなりの高温。(気象庁仙台管区気象台)</p> <p>【向こう3か月の天候の見通し 8月～10月】</p> <p>東北地方の向こう3か月の平均気温は平年並か高い見込み。降水量は、ほぼ平年並の見込み。(気象庁仙台管区気象台)</p>	<p>「ひとめぼれ」及び「あきたこまち」を中心とする品種構成となっている。県では「ひとめぼれ」「あきたこまち」からオリジナル品種「銀河のしずく」に転換を図ることとしている。</p>
		<p>【出穂状況】</p> <p>・8月14日現在、62,239ha(県作付見込面積の97.4%)が出穂が確認されている。</p> <p>県全体では8月12日に穂揃期(県作付見込面積の95%が出穂)に達した。(宮城県 8月14日付)</p>	<p>【向こう1か月の天候の見通し 8月22日～9月21日】</p> <p>東北地方の向こう1か月の気温は高い見込み。降水量と日照時間は、ほぼ平年並の見込み。(気象庁仙台管区気象台)</p> <p>【高温に関する早期天候情報】</p> <p>東北地方は、8月24日頃からかなりの高温。(気象庁仙台管区気象台)</p> <p>【向こう3か月の天候の見通し 8月～10月】</p> <p>東北地方の向こう3か月の平均気温は平年並か高い見込み。降水量は、ほぼ平年並の見込み。(気象庁仙台管区気象台)</p>	<p>「ひとめぼれ」を中心とする品種構成となっており、「つや姫」が増加傾向となっている。「萌えみのり」「たて正寿」はやや増加傾向にある。</p>
秋田	(生育)	<p>(山本) 管内では8月11日までに、全てのほ場で出穂たとみられる。(8月14日付)</p> <p>(由利) 管内では水稻の出穂が始まっている。(8月11日付)</p> <p>(雄勝) 出穂盛期が9月3日と、平年よりも2日早い状況。(8月7日付)</p> <p>(平鹿) 管内の出穂期は平年並の8月4日。(8月7日付)</p> <p>(秋田) 7月22日時点での生育は、草丈、茎数、葉色ともほぼ平年並みで推移。出穂期にさしかかっている圃場が一部のみ。(8月3日付)</p> <p>(秋田県農林政策課)</p>	<p>【向こう1か月の天候の見通し 8月22日～9月21日】</p> <p>東北地方の向こう1か月の気温は高い見込み。降水量と日照時間は、ほぼ平年並の見込み。(気象庁仙台管区気象台)</p> <p>【高温に関する早期天候情報】</p> <p>東北地方は、8月24日頃からかなりの高温。(気象庁仙台管区気象台)</p> <p>【向こう3か月の天候の見通し 8月～10月】</p> <p>東北地方の向こう3か月の平均気温は平年並か高い見込み。降水量は、ほぼ平年並の見込み。(気象庁仙台管区気象台)</p>	<p>「あきたこまち」を中心とする品種構成に大きな変化はないものの、「めんこいな」「ゆめおぼこ」等の多収性品種が増加傾向となり、一定のウェイトを占めてきた。</p>
		<p>(酒田飽海)</p> <p>・出穂期は、生育診断では「はえぬき」が9月3日(平年8月4日)、「つや姫」が8月11日(平年8月10日)、「雪若丸」が8月5日(平年8月4日)と、ほぼ平年並となった。管内全体でも、おおむね平年並の出穂期となっている。</p> <p>・穂揃期の生育診断時の生育状況は、一穂数数は平年並～やや少ない、穂数、㎡あたりの総穂数は品種や圃場ごとのバラツキがある。</p> <p>管内全体では、葉色は濃い、穂数はやや少ない、穂数は平年並～やや少ないとみられる。</p> <p>(庄内総合支庁酒田農業技術普及課 8月19日付)</p> <p>(酒田飽海)【つや姫】(8月18日現在)</p> <p>・穂数：圃場間でバラつき大きい。</p> <p>・1穂穂数：やや少ない。</p> <p>(庄内総合支庁酒田農業技術普及課 8月19日付)</p>	<p>【向こう1か月の天候の見通し 8月22日～9月21日】</p> <p>東北地方の向こう1か月の気温は高い見込み。降水量と日照時間は、ほぼ平年並の見込み。(気象庁仙台管区気象台)</p> <p>【高温に関する早期天候情報】</p> <p>東北地方は、8月24日頃からかなりの高温。(気象庁仙台管区気象台)</p> <p>【向こう3か月の天候の見通し 8月～10月】</p> <p>東北地方の向こう3か月の平均気温は平年並か高い見込み。降水量は、ほぼ平年並の見込み。(気象庁仙台管区気象台)</p>	<p>「はえぬき」「つや姫」「ひとめぼれ」を中心とする品種構成となっている。新品種「雪若丸」は増加傾向にある。</p>
福島	(生育)	<p>【7月末現在】</p> <p>・幼穂形成始期は、農業総合センター本部(郡山市)で3～5日の遅れ。</p> <p>・会津地域研究所(会津坂下町)、浜地域研究所(相馬市)では平年並となっている。</p> <p>(福島県 8月6日付)</p>	<p>【向こう1か月の天候の見通し 8月22日～9月21日】</p> <p>東北地方の向こう1か月の気温は高い見込み。降水量と日照時間は、ほぼ平年並の見込み。(気象庁仙台管区気象台)</p> <p>【高温に関する早期天候情報】</p> <p>東北地方は、8月24日頃からかなりの高温。(気象庁仙台管区気象台)</p> <p>【向こう3か月の天候の見通し 8月～10月】</p> <p>東北地方の向こう3か月の平均気温は平年並か高い見込み。降水量は、ほぼ平年並の見込み。(気象庁仙台管区気象台)</p>	<p>「コシヒカリ」「ひとめぼれ」を中心とする品種構成で、近年「天のつば」が増加傾向となっている。</p>

茨城	生育状況等		
	<p>【水稲の生育状況（8月7日現在、水戸市）】（茨城県農業総合センター農業研究所作物研究室 8月11日付）            (5月1日移植「あきたこまち」「コシヒカリ」「ふくまる」)            ・出穂期は、「あきたこまち」が平年より2日早い7月14日、「ふくまる」が平年より1日早い7月16日、「コシヒカリ」が平年より4日遅い7月29日だった。            ・登熟積算気温による成熟期の予測日は、「あきたこまち」で平年より2日遅い8月23日、「ふくまる」で2日遅い8月25日、「コシヒカリ」で6日遅い9月9日である。            ・現在のところ、㎡当たり穂数は、3品種とも平年に比べ少ない。            (5月11日移植「コシヒカリ」)            ・出穂期は、平年より4日遅い8月4日だった。登熟積算気温による成熟期の予測日は、平年より5日遅い9月14日である。            ・現在のところ、㎡当たり穂数は、平年に比べ少ない。</p> <p>【水稲の生育状況（8月6日現在、龍ヶ崎市）】（茨城県農業総合センター農業研究所水田利用研究室 8月11日付）            (4月24日移植「あきたこまち」「コシヒカリ」「ふくまる」)            ・出穂期は「あきたこまち」で平年より1日遅い7月12日、「ふくまる」で1日遅い7月16日、「コシヒカリ」で6日遅い7月27日だった。            ・今後気温が平年並に推移した場合、登熟積算気温による成熟期の予測は、「あきたこまち」で平年より5日遅い8月23日、「ふくまる」で4日遅い8月26日、「コシヒカリ」で7日遅い9月6日である。            ・現在のところ、いずれの品種も穂数が少なく、「あきたこまち」および「ふくまる」では一穂数も少ないことから、いずれの品種も㎡当たり穂数は少ない。            (5月7日移植「あきたこまち」「コシヒカリ」)            ・出穂期は「あきたこまち」で平年より5日遅い7月23日、「コシヒカリ」で8日遅い8月3日だった。            ・今後気温が平年並に推移した場合、登熟積算気温による成熟期の予測は、「あきたこまち」で平年より7日遅い9月2日、「コシヒカリ」で平年より9日遅い9月14日である。            ・現在のところ、両品種とも穂数は少ないが、「あきたこまち」では一穂数も多く、㎡当たり穂数は平年並である。「コシヒカリ」では一穂数がやや多いが、㎡当たり穂数は少ない。</p>	<p>【向こう1か月の天候の見通し 8月22日～9月21日】            関東甲信地方の向こう1か月の気温は高い見込み。            降水量は平年並か多く、日照時間は、ほぼ平年並の見込み。            (気象庁東京管区気象台)</p> <p>【高温に関する早期天候情報】            関東甲信地方は、8月24日頃からかなりの高温。            (気象庁)</p> <p>【向こう3か月の天候の見通し 8月～10月】            関東甲信地方の向こう3か月の気温は高い見込み。            降水量はほぼ平年並の見込み。(気象庁東京管区気象台)</p>	<p>「コシヒカリ」「あきたこまち」を中心とする品種構成となっている。なお、オリジナル品種「ふくまる」がやや増加傾向にある。</p>
栃木	<p>(下都賀)            【早稲・水稲生育診断（小山市鏡）(7月20日調査)の生育調査結果】            ・5月9日移植の「コシヒカリ」では、7月24日に出穂期を迎えた。(昨年7月26日)。(下都賀農業振興事務所 7月30日付)</p> <p>【普通稲・水稲生育診断（栃木市皆川城内町）(7月20日調査)の生育調査結果】            ・5月23日移植の「とちぎの星」の出穂期は、8月13日頃と予測される。(下都賀農業振興事務所 7月30日付)</p> <p>(生育) 【7月20日生育調査】            (1) コシヒカリ            ・出穂は平年よりやや遅れる見込みとなっている。            (2) とちぎの星            ・草丈はやや高く(平年比104%)、莖数は少なく(91%)、葉齢は平年より0.4少ない。葉色は平年より0.2淡く、生育診断値(葉色×莖数)は平年比86%となっている。なお、葉いもちが確認されている。            (栃木県 7月27日付)</p>	<p>【向こう1か月の天候の見通し 8月22日～9月21日】            関東甲信地方の向こう1か月の気温は高い見込み。            降水量は平年並か多く、日照時間は、ほぼ平年並の見込み。            (気象庁東京管区気象台)</p> <p>【高温に関する早期天候情報】            関東甲信地方は、8月24日頃からかなりの高温。            (気象庁)</p> <p>【向こう3か月の天候の見通し 8月～10月】            関東甲信地方の向こう3か月の気温は高い見込み。            降水量は、ほぼ平年並の見込み。            (気象庁東京管区気象台)</p>	<p>「コシヒカリ」「あきたこまち」を中心とする品種構成に大きな変化はないが、オリジナル品種「とちぎの星」がやや増加傾向にある。</p>
千葉	<p>(生育) ・7月中旬以降、気温が低く、日照が少なかったため、「ふさおとめ」「ふさこがね」では登熟の遅れ、「コシヒカリ」「粒すけ」では出穂の遅れが生じている。            ・(成熟期)            4月20日植え「ふさおとめ」が8月13日頃から、「ふさこがね」は8月20日頃から、「コシヒカリ」は8月26日頃からと予測される。            ・また「コシヒカリ」は出穂にバラつきが見られる。            (千葉県 7月28日付)</p>	<p>【向こう1か月の天候の見通し 8月22日～9月21日】            関東甲信地方の向こう1か月の気温は高い見込み。            降水量は平年並か多く、日照時間は、ほぼ平年並の見込み。            (気象庁東京管区気象台)</p> <p>【高温に関する早期天候情報】            関東甲信地方は、8月24日頃からかなりの高温。            (気象庁)</p> <p>【向こう3か月の天候の見通し 8月～10月】            関東甲信地方の向こう3か月の気温は高い見込み。            降水量は、ほぼ平年並の見込み。            (気象庁東京管区気象台)</p>	<p>「コシヒカリ」「ふさこがね」「ふさおとめ」を中心とする品種構成であり、近年「ふさこがね」が増加傾向にある。</p>
新潟	<p>(新潟) 【収穫期をめやす(8月16日現在)】            「ゆきん子舞」9月2日、「こしいぶき」9月3日、「コシヒカリ(5/月5日植)」9月17日、「コシヒカリ(5月10日植)」9月19日、「新之助」9月28日(新潟農業普及指導センター 8月17日付)</p> <p>(生育) (巻) ・出穂期は、早生で平年並、「コシヒカリ」または中生で平年比2日遅れ。早生は8月下旬から収穫期を迎える見込み。(巻農業普及指導センター 8月12日付)</p> <p>(長岡) 【収穫期の予想】「つきあかり」8月30日、「ゆきん子舞・ゆきの精」8月28日、「こしいぶき」8月31日、「コシヒカリ(移植)」9月13日            (長岡農業普及指導センター 8月12日付)</p>	<p>【向こう1か月の天候の見通し 8月22日～9月21日】            北陸地方の向こう1か月の気温は高い見込み。            降水量と日照時間は、ほぼ平年並の見込み。            (気象庁新潟地方気象台)</p> <p>【向こう3か月の天候の見通し 8月～10月】            北陸地方の向こう3か月の気温は高い見込み。            降水量は、ほぼ平年並の見込み。            (気象庁新潟地方気象台)</p>	<p>「コシヒカリ」「こしいぶき」を中心とする品種構成で、近年「コシヒカリ」が減少傾向にある。また、県では新品種「新之助」の作付拡大を推奨している。</p>
富山	<p>【7月20日生育観測】            (1) コシヒカリ            平年に比べて、草丈、莖数、葉色、葉齢は並みとなっている。            出穂期は、今後、平年並みの気温で推移した場合、平年並みの8月2日頃と見込まれる。            (2) てんこもり            平年に比べて、草丈、葉色は並み、莖数はやや少なく、葉齢は遅れている。            出穂期は、今後、平年並みの気温で推移した場合、平年より1日遅い8月5日頃と見込まれる。            (3) てんたかく            5月2日移植の「てんたかく」の出穂期は、平年より4日早い7月16日となった。            成熟期は、今後、平年並みの気温で推移した場合、平年より4日早い8月21日頃と見込まれる。            (4) 富富富            近年に比べて、草丈、莖数、葉齢、葉色は並みとなっている。            今後、気温が平年並みに推移すると、出穂期は、近年より1日遅い8月4日頃と見込まれる            (富山県農業技術課 広域普及指導センター 7月20日付)</p>	<p>【向こう1か月の天候の見通し 8月22日～9月21日】            北陸地方の向こう1か月の気温は高い見込み。            降水量と日照時間は、ほぼ平年並の見込み。            (気象庁新潟地方気象台)</p> <p>【向こう3か月の天候の見通し 8月～10月】            北陸地方の向こう3か月の気温は高い見込み。            降水量は、ほぼ平年並の見込み。            (気象庁新潟地方気象台)</p>	<p>「コシヒカリ」を中心とする品種構成となっている。高温条件下でも品質が安定している「てんこもり」「富富富」が増加傾向にある。</p>
石川	<p>【本田の生育7月28日調査】            「コシヒカリ」            (出穂期) 加賀地域では7月25日～8月2日と、平年に比べ3日早い～並で、前年に比べ1日早い～4日遅い見込み。            能登地域では7月29日～7月31日と、平年に比べ2日～7日早く、前年に比べ2～3日遅い見込み。            (平米あたり莖数)            既に収穫期を迎えている圃場が多いことから、穂数は平年並に確保される見込みである。            「ひやくまん穀」            (出穂期) 加賀地域で8月3日～12日と近年及び前年に比べ2日～6日遅い見込み。            能登地域では8月8日～10日と近年及び前年並～2日遅い見込み。            (平米あたり莖数) 目標穂数(360本/㎡)は確保される見込みである。(石川県農林総合研究センター 7月29日付)</p>	<p>【向こう1か月の天候の見通し 8月22日～9月21日】            北陸地方の向こう1か月の気温は高い見込み。            降水量と日照時間は、ほぼ平年並の見込み。            (気象庁新潟地方気象台)</p> <p>【向こう3か月の天候の見通し 8月～10月】            北陸地方の向こう3か月の気温は高い見込み。            降水量は、ほぼ平年並の見込み。            (気象庁新潟地方気象台)</p>	<p>「コシヒカリ」及び「ひやくまん穀」が増加傾向にある。近年「コシヒカリ」が減少傾向にある。また、県では新品種「ひやくまん穀」が増加傾向にある。なお、新品種である「いちほまれ」も増加傾向にある。</p>
福井	<p>【8月17日水稲登熟状況】            ・ハナエチゼンでは青枯発生率が高くても胴割粒が多くなってきている。            (水田農業レベルアップ委員会技術普及部会 8月18日付)</p> <p>(生育) 【農試における出穂期以降の積算気温に基づく収穫期予想】            ・ハナエチゼン(5月2日植) 出穂期 7月16日、積算気温860℃に到達する日 8月17日。            ・コシヒカリ(5月20日植) 出穂期 8月4日、積算気温990℃に到達する日 9月10日。            (水田農業レベルアップ委員会技術普及部会 8月12日付)</p>	<p>【向こう1か月の天候の見通し 8月22日～9月21日】            北陸地方の向こう1か月の気温は高い見込み。            降水量と日照時間は、ほぼ平年並の見込み。            (気象庁新潟地方気象台)</p> <p>【向こう3か月の天候の見通し 8月～10月】            北陸地方の向こう3か月の気温は高い見込み。            降水量は、ほぼ平年並の見込み。            (気象庁新潟地方気象台)</p> <p>【注意報】(穂いもち(中晩生))            発生量は平年、前年より多い。            (福井県農業試験場 7月27日付)</p>	<p>「コシヒカリ」「ハナエチゼン」を中心とする品種構成であるが、近年「コシヒカリ」が減少傾向にある。「あきさかり」が増加傾向にある。なお、新品種である「いちほまれ」も増加傾向にある。</p>
長野	<p>【標高340m須坂市八重森の農業試験場における水稲生育状況(8月7日現在)】(長野県農業試験場 8月11日付)            ・幼穂形成期は「あきたこまち」で平年より2日遅く、「コシヒカリ」で平年並み、「風さやか」で1日早かった。            ・出穂期は「あきたこまち」、「コシヒカリ」で平年より1日遅かった。            【標高1017m高村の農科試験場における水稲生育状況(8月7日現在)】(長野県農業試験場 8月11日付)            ・幼穂形成期は「きらりん」、「ゆめしなの」で平年より2日早く、「あきたこまち」で2日遅かった。移植後50日調査では、低温、降雨の影響で生育はやや停滞したと思われる。            ・出穂期は平年より「きらりん」で1日早く、「ゆめしなの」で2日遅い。            ・豊科定点圃場では、あきたこまちは7月26日、美山錦は7月30日に出穂期を迎えた。コシヒカリは8月2日に収穫期を迎え、8月6日に出穂期を迎える予定。            ・現地の平坦地では、5月初旬植の早生品種(あきたこまち、美山錦等)は、7月20～23日頃に出穂期を迎えた。5月初旬植のコシヒカリは7月末に出穂期を迎え始めた。このため生育進捗は、早生品種で平年並～2日早、コシヒカリで3日早いと思われる。            (松本農業農村支援センター 8月3日付)</p>	<p>【向こう1か月の天候の見通し 8月22日～9月21日】            関東甲信地方の向こう1か月の気温は高い見込み。            降水量は平年並か多く、日照時間は、ほぼ平年並の見込み。            (気象庁東京管区気象台)</p> <p>【高温に関する早期天候情報】            関東甲信地方は、8月24日頃からかなりの高温。            (気象庁)</p> <p>【向こう3か月の天候の見通し 8月～10月】            関東甲信地方の向こう3か月の気温は高い見込み。            降水量は、ほぼ平年並の見込み。            (気象庁東京管区気象台)</p>	<p>「コシヒカリ」「あきたこまち」を中心とする品種構成に大きな変化はない。県オリジナル品種として「風さやか」の導入を推進している。</p>

生育状況等			
滋賀	<p>【農業技術振興センター水稲作況調査（7月20日時点）】</p> <p>（5月11日移植）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・「みずかがみ」「コシヒカリ」とも草丈は平年並、茎数は少ない。</li> </ul> <p>（生育）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・「みずかがみ」の出穂期は、7月上旬～中旬の気温が低く、平年より2日遅い7月24日頃の見込み。</li> </ul> <p>（滋賀県農業技術振興センター 7月22日付）</p>	<p>【向こう1か月の天候の見通し 8月22日～9月21日】</p> <p>近畿地方の向こう1か月の平均気温は高い見込み。降水量は日本海側で、ほぼ平年並、太平洋側で平年並が多い見込み。日照時間は、ほぼ平年並の見込み。（気象庁大阪管区気象台）</p> <p>【高温に関する早期天候情報】</p> <p>近畿地方は、8月23日頃からかなりの高温。（気象庁大阪管区気象台）</p> <p>【向こう3か月の天候の見通し 8月～10月】</p> <p>近畿地方の向こう3か月の平均気温は高い見込み。降水量は、ほぼ平年並の見込み。（気象庁大阪管区気象台）</p>	<p>「コシヒカリ」「キヌヒカリ」「日本晴」を中心とする品種構成であるが、近年「コシヒカリ」「キヌヒカリ」が減少傾向となっている。高温多湿性に優れた「みずかがみ」を増加する計画である。</p>
兵庫	<p>（県南部）</p> <p>極早生品種の「キヌヒカリ」「どんとこい」では、草丈が平年並～やや短く、茎数はかなり多い。一方、普通期の「ヒノヒカリ」「日本晴」「きぬむすめ」では、草丈は平年に比べてやや短い～平年並み、茎数は「ヒノヒカリ」「日本晴」でかなり少なく、「きぬむすめ」でかなり多い。</p> <p>（県北部）</p> <p>（生育） 草丈は平年並で、茎数が非常に少ない。出穂は「コシヒカリ」で平年よりやや早くなる見込みである。</p> <p>（兵庫県 8月4日付）</p>	<p>【向こう1か月の天候の見通し 8月22日～9月21日】</p> <p>近畿地方の向こう1か月の平均気温は高い見込み。降水量は日本海側で、ほぼ平年並、太平洋側で平年並が多い見込み。日照時間は、ほぼ平年並の見込み。（気象庁大阪管区気象台）</p> <p>【高温に関する早期天候情報】</p> <p>近畿地方は、8月23日頃からかなりの高温。（気象庁大阪管区気象台）</p> <p>【向こう3か月の天候の見通し 8月～10月】</p> <p>近畿地方の向こう3か月の平均気温は高い見込み。降水量は、ほぼ平年並の見込み。（気象庁大阪管区気象台）</p>	<p>「コシヒカリ」「ヒノヒカリ」「キヌヒカリ」「山田錦」を中心とする品種構成である。「きぬむすめ」の作付推進を図っている。</p>
岡山	<p>（生育）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・イネの茎数は、平年よりやや少ない傾向である。</li> </ul> <p>（岡山県 8月5日付）</p>	<p>【向こう1か月の天候の見通し 8月22日～9月21日】</p> <p>中国地方の向こう1か月の平均気温は高い見込み。降水量と日照時間は、ほぼ平年並の見込み。（気象庁広島地方気象台）</p> <p>【高温に関する早期天候情報】</p> <p>中国地方は、8月23日頃からかなりの高温。（気象庁広島地方気象台）</p> <p>【向こう3か月の天候の見通し 8月～10月】</p> <p>中国地方の向こう3か月の平均気温は高い見込み。降水量は、ほぼ平年並の見込み。（気象庁広島地方気象台）</p>	<p>「アケボノ」「ヒノヒカリ」「あきたこまち」「コシヒカリ」を中心とする品種構成である。近年「きぬむすめ」が増加傾向となっている。</p>
広島		<p>【向こう1か月の天候の見通し 8月22日～9月21日】</p> <p>中国地方の向こう1か月の平均気温は高い見込み。降水量と日照時間は、ほぼ平年並の見込み。（気象庁広島地方気象台）</p> <p>【高温に関する早期天候情報】</p> <p>中国地方は、8月23日頃からかなりの高温。（気象庁広島地方気象台）</p> <p>【向こう3か月の天候の見通し 8月～10月】</p> <p>中国地方の向こう3か月の平均気温は高い見込み。降水量は、ほぼ平年並の見込み。（気象庁広島地方気象台）</p>	<p>「あきさかり」が増加傾向にある。</p>
愛媛	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本年の早期水稲の出穂時期は、やや早い～平年並みであった。向こう1か月の平均気温は、ほぼ平年並であり、成熟期については平年並と予想される。</li> </ul> <p>（平年の成熟期 4月20日移植）</p> <p>「あきたこまち」 8月9日頃</p> <p>「コシヒカリ」 8月14日頃</p> <p>（愛媛県 7月28日付）</p>	<p>【向こう1か月の天候の見通し 8月22日～9月21日】</p> <p>四国地方の向こう1か月の平均気温は高い見込み。降水量は平年並が多く、日照時間は、ほぼ平年並の見込み。（気象庁高松地方気象台）</p> <p>【高温に関する早期天候情報】</p> <p>四国地方は、8月23日頃からかなりの高温。（気象庁高松地方気象台）</p> <p>【向こう3か月の天候の見通し 8月～10月】</p> <p>四国地方の向こう3か月の平均気温は高い見込み。降水量は、ほぼ平年並の見込み。（気象庁高松地方気象台）</p>	<p>「ヒノヒカリ」「コシヒカリ」「あきたこまち」「こまる」を中心とする品種構成に大きな変化はない。</p>
高知	<p>（早期稲 7月月報）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・極早生品種（南国そだち、よき恋美人）の収穫はほぼ終了したが、梅雨末期の降雨の影響で平年に比べると遅れた。コシヒカリについてはほぼ平年並に収穫が始まる見込みである。</li> </ul> <p>（普通期稲 7月月報）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・7月の天候不順の影響で生育がやや遅れ気味のほ場も見られるが、生育はおおむね順調で、出穂は8月中旬頃になる見込みである。</li> </ul> <p>（高知県病害虫防除所長 8月6日付）</p>	<p>【向こう1か月の天候の見通し 8月22日～9月21日】</p> <p>四国地方の向こう1か月の平均気温は高い見込み。降水量は平年並が多く、日照時間は、ほぼ平年並の見込み。（気象庁高松地方気象台）</p> <p>【高温に関する早期天候情報】</p> <p>四国地方は、8月23日頃からかなりの高温。（気象庁高松地方気象台）</p> <p>【向こう3か月の天候の見通し 8月～10月】</p> <p>四国地方の向こう3か月の平均気温は高い見込み。降水量は、ほぼ平年並の見込み。（気象庁高松地方気象台）</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・早期栽培では「コシヒカリ」「ヒノヒカリ」を中心とする品種構成であるが、近年、高温多湿性に優れた「よき恋美人」が増加傾向にある。「南国そだち」は減少傾向。</li> <li>・普通栽培では「こまる」が増加傾向にある。</li> </ul>
福岡	<p>【早生水稲（夢つくし、コシヒカリ）】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・4月中下旬「コシヒカリ」「夢つくし」の収穫適期は、平年よりやや遅く8月17～27日頃の見込み。</li> <li>・降雨が多いため、出穂から穂ぞろい期の防除が遅れている。</li> <li>・穂数は平年より少なく、出穂後の日照不足の影響により、登熟歩合が低下し、作柄はやや不良の予想。</li> </ul> <p>【普通期水稲（夢つくし、元気づくし、ヒノヒカリなど）】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・7月の低温、曇照の影響で、草丈は高く、茎数は少なく、軟弱徒長となっている。</li> <li>・生育は、平年に比べ5日程度遅れ、浸冠水の被害を受けた地域はさらに遅れている。</li> <li>・6月上中旬「夢つくし」の出穂期は、平年よりやや遅い8月12～15日頃の見込み。</li> <li>・暖冬の影響と多雨によりスモリシコガイの被害が多い。粟いもちの発生は過去10年間で最も多く、注意報が7月14日に発表されている。</li> </ul> <p>（福岡県農林業総合試験場 7月31日付）</p>	<p>【向こう1か月の天候の見通し 8月22日～9月21日】</p> <p>九州北部地方の向こう1か月の平均気温は高い見込み。降水量と日照時間は、ほぼ平年並の見込み。（気象庁福岡管区気象台）</p> <p>【高温に関する早期天候情報】</p> <p>九州北部地方は、8月23日頃からかなりの高温。（気象庁福岡管区気象台）</p> <p>【向こう3か月の天候の見通し 8月～10月】</p> <p>九州北部地方の3か月の平均気温は高い見込み。降水量は、ほぼ平年並の見込み。（気象庁福岡管区気象台）</p>	<p>「ヒノヒカリ」「夢つくし」「元気づくし」を中心とする品種構成であるが、「ヒノヒカリ」が減少傾向。「夢つくし」「元気づくし」が増加傾向となっている。なお、県では今後、新品種「美りつくし」の拡大を推奨している。</p>
熊本		<p>【向こう1か月の天候の見通し 8月22日～9月21日】</p> <p>九州北部地方の向こう1か月の平均気温は高い見込み。降水量と日照時間は、ほぼ平年並の見込み。（気象庁福岡管区気象台）</p> <p>【高温に関する早期天候情報】</p> <p>九州北部地方は、8月23日頃からかなりの高温。（気象庁福岡管区気象台）</p> <p>【向こう3か月の天候の見通し 8月～10月】</p> <p>九州北部地方の3か月の平均気温は高い見込み。降水量は、ほぼ平年並の見込み。（気象庁福岡管区気象台）</p>	<p>「ヒノヒカリ」「森のくまさん」「コシヒカリ」を中心とする品種構成に、大きな変化はない。</p>

生育状況等			
宮 崎	<p>・全額数は平年並、登熟はやや不良、作柄はやや不良の見込。(農林水産省 7月28日付)</p> <p>(生育・作柄)</p> <p>・(7月中旬)普通期水稲は分けつ期。(宮崎県病害虫防除・肥料検査センター 7月22日付)</p>	<p>【向こう1か月の天候の見通し 8月22日～8月21日】 九州南部地方の向こう1か月の気温は高い見込み。 降水量は平年並か多く、日照時間は、ほぼ平年並の見込み。 (気象庁鹿児島地方気象台)</p> <p>【高温に関する早期天候情報】 九州南部地方は、8月23日頃からかなりの高温。 (気象庁鹿児島地方気象台)</p> <p>【向こう3か月の天候の見通し 8月～10月】 九州南部地方の向こう3か月の気温は高い見込み。 降水量は、ほぼ平年並の見込み。 (気象庁鹿児島地方気象台)</p>	<p>「コシヒカリ」「ヒノヒカリ」を中心とする品種構成に大きな変化はない。「み系358」への作付誘導が進められている。</p>
鹿 児 島	<p>・全額数はやや少ない、登熟は平年並、作柄はやや不良の見込。(農林水産省 7月28日付)</p> <p>(生育・作柄)</p>	<p>【向こう1か月の天候の見通し 8月22日～8月21日】 九州南部地方の向こう1か月の気温は高い見込み。 降水量は平年並か多く、日照時間は、ほぼ平年並の見込み。 (気象庁鹿児島地方気象台)</p> <p>【高温に関する早期天候情報】 九州南部地方は、8月23日頃からかなりの高温。 (気象庁鹿児島地方気象台)</p> <p>【向こう3か月の天候の見通し 8月～10月】 九州南部地方の向こう3か月の気温は高い見込み。 降水量は、ほぼ平年並の見込み。 (気象庁鹿児島地方気象台)</p>	<p>「なつほのか」及び「あきほなみ」が増加傾向である。</p>

注1：国及び地方自治体、地方自治体の出先機関等がホームページで公表している資料を米穀機構情報部で取り纏め。  
注2：令和2年8月20日15時時点での取り纏め。  
注3：更新箇所は赤字で示した。

引用資料:

農作物の生育状況 8月15日現在(北海道 8月19日)、  
農作物生育状況 8月15日現在(北海道空知総合振興局 8月19日)、  
農作物生育状況 8月15日現在(北海道石狩振興局 8月19日)、  
農作物の生育状況 8月15日現在(北海道後志総合振興局 8月19日)、  
農作物の生育状況 8月15日現在(北海道胆振総合振興局 8月19日)、  
農作物の生育状況 8月15日現在(北海道日高振興局 8月19日)、  
農作物の生育状況 8月15日現在(北海道渡島総合振興局 8月19日)、  
農作物の生育状況 8月15日現在(北海道檜山振興局 8月19日)、  
農作物の生育状況 8月15日現在(北海道上川総合振興局 8月19日)、  
農作物生育状況調査の概要 8月15日現在(北海道留萌振興局 8月19日)、  
農作物の生育と農作業の進捗状況 8月15日現在(北海道オホーツク総合振興局 8月19日)、  
8月10日現在水稲出穂状況(8月12日現在)(青森県 8月6日)、  
作況調査報告(生育ステージ)(青森県産業技術センター農林総合研究所 8月6日)、  
令和2年度水稲生育定期調査結果No.7(8月15日現在)(岩手県農業研究センター 8月17日)、  
令和2年度産水稲の出穂状況について(8月14日現在)(宮城県農政部みやぎ米推進課 8月14日)、  
生育状況報告(秋田県ホームページ「こまちチャンネル」<http://www.e-komachi.jp/> 8月14日)、  
酒田・飽海日本一米づくり情報第10号(酒田農業技術普及課 8月19日)、  
酒田・飽海つや姫情報(庄内総合支庁酒田農業技術普及課 8月19日)、  
主要な農作物の生育情報令和2年度第5号(福島県農林水産部 8月6日)、  
農研速報(茨城県農業総合センター農業研究所作物研究室 8月11日)、  
農研速報(茨城県農業総合センター農業研究所水田利用研究室 8月11日)、  
下都賀管内水稲技術資料No.6(下都賀農業振興事務所 7月30日)、  
令和2(2020)年度水稲生育診断予測事業速報No.5(栃木県 7月27日)、  
水稲の生育と当面の対策第6報(千葉県 7月28日)、  
稲作技術情報No.5(新潟農業普及指導センター 8月17日)、  
稲作技術対策資料No.5(巻農業普及指導センター 8月12日)、  
稲作情報No.7(長岡農業普及指導センター 8月12日)、  
TACS情報第9号(富山県 7月20日)、  
令和2年度産水稲の生育状況と今後の対策(水稲生育診断技術確立調査-9号)(石川県農林総合研究センター 7月28日調査)、  
稲作情報No.16(水田農業レベルアップ委員会技術普及部会 8月18日)、  
令和2年度作物技術普及情報第10号(松本農業農村支援センター 8月3日)、  
水稲高標高試験圃の生育状況(令和2年)(長野県農業試験場 8月11日)、  
農業試験場水稲試験圃の生育状況(令和2年)(長野県農業試験場 8月11日)、  
令和2年度水稲生育診断情報No.4(滋賀県農業技術振興センター 7月22日)、  
令和2年度兵庫県農業気象技術情報No.4(8月情報)(兵庫県 8月4日)、  
令和2年度病害虫発生予報第5号(岡山県病害虫防除所 8月5日)、  
今月の天候と農作業(8月)(愛媛県 7月28日)、  
令和2年度病害虫発生予察7月月報(高知県病害虫防除所 8月6日)、  
福岡県の主な農産物の生産情報(福岡県 7月31日現在)、  
令和2年度病害虫発生予報第3号(宮崎県病害虫防除所・肥料検査センター 7月22日)、

北海道地方向こう1か月の天候の見通し(8月20日札幌管区气象台)、東北地方向こう1か月の天候の見通し(8月20日仙台管区气象台)、関東甲信地方向こう1か月の天候の見通し(8月20日气象台)、  
北陸地方向こう1か月の天候の見通し(8月20日新潟地方气象台)、近畿地方向こう1か月の天候の見通し(8月20日大阪管区气象台)、中国地方向こう1か月の天候の見通し(8月20日広島地方气象台)、  
四国地方向こう1か月の天候の見通し(8月20日高松地方气象台)、九州北部地方向こう1か月の天候の見通し(8月20日福岡管区气象台)、  
九州南部・奄美地方向こう1か月の天候の見通し(8月20日鹿児島地方气象台)、

北海道地方向こう3か月の天候の見通し(7月22日札幌管区气象台)、東北地方向こう3か月の天候の見通し(7月22日仙台管区气象台)、関東甲信地方向こう3か月の天候の見通し(7月22日气象台)、  
北陸地方向こう3か月の天候の見通し(7月22日新潟地方气象台)、近畿地方向こう3か月の天候の見通し(7月22日大阪管区气象台)、中国地方向こう3か月の天候の見通し(7月22日広島地方气象台)、  
四国地方向こう3か月の天候の見通し(7月22日高松地方气象台)、九州北部地方向こう3か月の天候の見通し(7月22日福岡管区气象台)、  
九州南部・奄美地方向こう3か月の天候の見通し(7月22日鹿児島地方气象台)、

高温に関する早期天候情報(仙台管区气象台、气象台、大阪管区气象台、広島地方气象台、高松地方气象台、福岡管区气象台、鹿児島地方气象台 8月17日14時30分)、

令和2年度産水稲の西南暖地における早期栽培等の作柄概況(7月15日現在)(農林水産省 7月28日)  
令和2年度産水稲の10a当たり平年収量に係る生産事情(都道府県別)(農林水産省 3月17日)